

	<b>IVE FARMACOLÒGICA</b>	<b>IVE INSTRUMENTAL</b>
<b>Setmanes d'embaràs</b>	Fins a les 9 setmanes	Fins a les 14 setmanes per voluntat expressa de la dona De més de 14 setmanes per motius mèdics
<b>Procediment</b>	Consisteix en la ingesta de dos fàrmacs. El primer es pren al centre on es realitza l'avortament i fa aturar l'embaràs. El segon es pren al domicili quan han passat 24-48 hores i provoca l'expulsió de los restes de l'embaràs	Es fa a un quiròfan d'un centre acreditat amb cirurgia sense ingrés. Fins a les 14 setmanes es pel mètode d'aspiració i es pot escollir fer-ho amb anestèsia local o sedació
<b>Número de visites</b>	3 Visites 1) Informació obligatòria i ecografia. 2) Administració del primer fàrmac -mínim a les 72 hores de la primera visita 3) Confirmació de l'avortament	1 sola visita al Centre Mèdic Adàlia La intervenció es fa amb seguiment ecogràfic i, així, ja es confirma l'èxit de l'avortament al mateix moment. Es recomana fer una revisió passats 10-15 dies
<b>Lloc de l'expulsió</b>	Al domicili	Al Centre Mèdic Adàlia
<b>Durada del procés</b>	L'expulsió es produeix entre les 24 i 48 hores posteriors a prendre el segon fàrmac i, normalment, pot durar entre 1 i 4 hores	La intervenció dura entre 3 i 7 minuts, malgrat que tot el procés es pot allargar fins a una hora (depenent molt de l'anestèsia que es tria)
<b>Dolor</b>	Dolor intens o molt intens el 72% dels casos (segons estadístiques)	Els minuts posteriors a la intervenció es pot notar un dolor similar al de la regla
<b>Efectes secundaris més freqüents</b>	En la majoria de casos es tenen calfreds i febre, a vegades pot ser alta Sagnat abundant Dolor abdominal intens o molt intens Marejos, nàusees i/o vòmits	Rarament es pot presentar dècimes de febre –febrícula- durant les primeres 48 hores. Alguns casos presenten dolor abdominal lleu els primers dies